

Hasta bilgilendirmesi

Omurgada infiltrasyonlar



MEDIZINISCH
RADIOLOGISCHES
INSTITUT

Sevgili hasta

Doktorunuz tarafından omurganızın infiltrasyonları için kayıt yaptırılmıştır. Bu infiltrasyon, sinir kökünüze ilgili belirtileriniz ve bulgularınız nedeniyle doktorunuzun emriyle, omurgadaki spinal kanal veya eklemlerde epidural alan içinde gerçekleştirilmektedir.

İnfiltrasyonun amacı, ağrıların lokal bir enjeksiyon uygulamasıyla dindirilmesidir. Bu sayede her türlü kas gerilimi de çözülebilir ve fizyoterapi gibi destekleyici tedbirler tekrar daha kolay hale gelebilir.

İnfiltrasyon süreci

İnfiltrasyon bilgisayar destekli tomografi (BT) ile gerçekleştirilmektedir. BT ile iğne tam olarak konumlandırılabilir. Planlama ve infiltrasyon için yaklaşık 15 dakika yatmanız gerekecektir. Sizinle yapılacak bir görüşme sonrasında radyolog birkaç BT görüntüsüyle optimum giriş yolunu planlar. İnce bir iğne yardımıyla derideki hassasiyet ortadan kaldırılır. Ardından iğne ekran kontrolüyle ileriye itilir, bu esnada lokal anestezi yapılır. Doğru iğne konumu ve etken madde dağılımı kontrast madde ile kontrol edilir.

Bu iğneyle az miktarda kortizon ve lokal anestezi maddesi enjekte edilir. Lokal anestezi birkaç dakika sonra ağrıları hissedilir derecede dindirecektir. Kortizon lokal inflamasyonları önler.

İnfiltrasyonun yerine ve doktorun emrine göre suda çözünür (Dexamethason) veya kristalin kortizon (Kenacort®) enjekte edilir.

Kenacort®, kristalin, uzun etkili bir kortizondur ve İsviçre'de onay verilmiş bir ilaçtır. Kenacort® genellikle eklemlere veya bursa içerisine enjekte edilir ve omurgada çok sık ve uzun yıllardan beri başarılı şekilde uygulanmaktadır.


Size, Kenacort® ilacının üretici bilgileri uyarınca omurgadaki epidural infiltrasyon için endike olmadığını bildirmek isteriz. Uygulama, onay sahasının dışında gerçekleştirilmektedir. Kenacort® ile uygulamayı istemediğiniz takdirde, başka bir ilaç enjekte edebiliriz. Daha kısa etkisi olan alternatif preparatlar mevcuttur.

Lokal anestezinin etkisi azaldıkça (birkaç saat sonra) bilinen ağrınız tekrar kısmen hissedilebilir. Kortizonun etkisi, yaklaşık 1-3 gün sonra artarak ortaya çıkacaktır.

Ağrıların azalmaması nadiren görülen bir durumdur.

Hangi yan etkiler görülebilir?

- Lokal anestezi nedeniyle birkaç saat boyunca duyu bozuklukları (karıncalanma) ve muhtemelen (kısmen daha belirgin) güçsüzlük meydana gelebilir. Bu sebepten dolayı birkaç saat motorlu araç kullanmamanız gerekir.
- Nadiren hematom oluşabilir.
- Kullanılan ilaçlar üzerine alerjiler.
- Enfeksiyonlar nadiren görülebilir.
- Teorik olarak kalıcı felç ile beraber sinir hasarı görülebilir, ancak nadiren görülür.
- Kortizon birkaç gün boyunca sıcak basmasına ve sinirliliğe yol açabilir.



Soyadı:

Adı:

Doğum tarihi:

Lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayın

	Evett	Hayır
Kan sulandırıcı kullanıyor musunuz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enfeksiyon şikayetiniz var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Şeker hastası (Diyabet) mısınız?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alerjileriniz var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebe misiniz veya gebe olabilir misiniz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onay sahası dışında Kenacort®'un kullanılmasını kabul ediyorum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tarih:

Hastanın imzası:

Radyolog: